

Imię i nazwisko: _____

Oddział: _____

Data badania: _____

Ocena Funkcji Seksualnych IBPH

Jeśli **nie jest** Pan aktywny seksualnie i **nie chce** Pan uczestniczyć w badaniu proszę zaznaczyć pole obok i zakończyć ankietę

Jeśli jest Pan aktywny seksualnie, ale nie chce Pan uczestniczyć w badaniu proszę zaznaczyć pole obok i zakończyć ankietę

Kwestionariusz IIEF

Jeśli jest Pan aktywny seksualnie i/lub chciałby Pan poddać się badaniu, proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania (proszę wybrać tylko jedną odpowiedź w każdym pytaniu).

1. W ciągu ostatnich 4 tygodni, jak często udało się Panu osiągnąć erekcję w czasie aktywności seksualnej?

0 Nie podejmowałem stosunków płciowych

5 Prawie zawsze lub zawsze

4 Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz)

3 Czasami (mniej więcej co drugi raz)

2 Kilkakrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz)

1 Prawie nigdy lub nigdy

2. W ciągu ostatnich 4 tygodni, jeśli wzwód prącia wystąpił u Pana w wyniku stymulacji seksualnej, jak często był nasilony na tyle, aby umożliwił wprowadzenie prącia do pochwy partnerki?

0 Nie podejmowałem stosunków płciowych

5 Prawie zawsze lub zawsze

4 Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz)

3 Czasami (mniej więcej co drugi raz)

2 Kilkakrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz)

1 Prawie nigdy lub nigdy

Pytania nr 3, 4 i 5 odnoszą się do erekcji, które miały związek z stosunkiem płciowym.

3. W ciągu ostatnich 4 tygodni, jeśli podejmował Pan stosunek seksualny, jak często był Pan w stanie wprowadzić prącie do pochwy partnerki?

0 Nie podejmowałem stosunków płciowych

5 Prawie zawsze lub zawsze

4 Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz)

3 Czasami (mniej więcej co drugi raz)

2 Kilkakrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz)

1 Prawie nigdy lub nigdy

4. W ciągu ostatnich 4 tygodni, podczas stosunku seksualnego, jak często był Pan w stanie utrzymać wzwód prącia po penetracji (wejściu) do pochwy partnerki?

0 Nie podejmowałem stosunków płciowych

5 Prawie zawsze lub zawsze

4 Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz)

3 Czasami (mniej więcej co drugi raz)

2 Kilkakrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz)

1 Prawie nigdy lub nigdy

5. W ciągu ostatnich 4 tygodni, podczas stosunku seksualnego, jak trudno było Panu utrzymać wzwód prącia do zakończenia stosunku?

0 Nie podejmowałem stosunków płciowych

5 Prawie zawsze lub zawsze

4 Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz)

3 Czasami (mniej więcej co drugi raz)

2 Kilkakrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz)

1 Prawie nigdy lub nigdy

6. W ciągu ostatnich 4 tygodni, ile razy podejmował Pan próby odbycia stosunku seksualnego?

0 Nie próbowałem odbywać stosunku seksualnego.

1 Próbowałem 1-2 razy.

2 Próbowałem 3-4 razy.

3 Próbowałem 5-6 razy.

4 Próbowałem 7-10 razy.

5 Próbowałem 11 i więcej razy.

7. W ciągu ostatnich 4 tygodni, kiedy próbował Pan odbyć stosunek seksualny, jak często było to dla Pana satysfakcjonujące?

0 Nie podejmowałem stosunków płciowych

5 Prawie zawsze lub zawsze

4 Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz)

3 Czasami (mniej więcej co drugi raz)

2 Kilkakrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz)

1 Prawie nigdy lub nigdy

8. W ciągu ostatnich 4 tygodni, jak bardzo był Pan zadowolony ze stosunków płciowych?

0 Nie było aktywności seksualnej

5 Bardzo zadowolony

4 Zdecydowanie zadowolony

3 Umiarkowanie zadowolony

2 Raczej niezadowolony

1 Niezadowolony

9. W ciągu ostatnich 4 tygodni, podczas stymulacji seksualnej lub stosunku seksualnego, jak często dochodziło u Pana do wytrysku (ejakulacji)?

0 Nie podejmowałem stosunków płciowych

5 Prawie zawsze lub zawsze

4 Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz)

3 Czasami (mniej więcej co drugi raz)

2 Kilkakrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz)

1 Prawie nigdy lub nigdy

10. W ciągu ostatnich 4 tygodni, podczas stymulacji seksualnej lub stosunku seksualnego, jak często dochodziło do osiągnięcia orgazmu (niezależnie od wystąpienia wytrysku)?

0 Nie podejmowałem stosunków płciowych

5 Prawie zawsze lub zawsze

4 Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz)

3 Czasami (mniej więcej co drugi raz)

2 Kilkakrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz)

1 Prawie nigdy lub nigdy

Pytania 11 i 12 odnoszą się do pożądania seksualnego. Pożądanie seksualne oznacza odczucia, które mogą obejmować chęć podjęcia zachowań seksualnych (np. masturbacja lub stosunek płciowy), myślenia o aktywności seksualnej lub uczucia frustracji z powodu braku seksu.

11. W ciągu ostatnich 4 tygodni, jak często odczuwał Pan pożądanie seksualne?

- 5 Prawie zawsze lub zawsze
- 4 Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz)
- 3 Czasami (mniej więcej co drugi raz)
- 2 Kilkakrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz)
- 1 Prawie nigdy lub nigdy

12. W ciągu ostatnich 4 tygodni, jak ocenia Pan stopień swojego pożądania seksualnego?

- 5 Bardzo wysoki
- 4 Wysoki
- 3 Umiarkowany
- 2 Niski
- 1 Bardzo niski lub wcale

13. W ciągu ostatnich 4 tygodni, jak ocenia Pan ogólne zadowolenie ze swojego życia seksualnego?

- 5 Bardzo zadowolony
- 4 Raczej zadowolony
- 3 Trudno powiedzieć
- 2 Raczej niezadowolony
- 1 Bardzo niezadowolony

14. W ciągu ostatnich 4 tygodni, jak ocenia Pan ogólne zadowolenie z relacji seksualnych ze swoją partnerską?

- 5 Bardzo zadowolony
- 4 Raczej zadowolony
- 3 Trudno powiedzieć
- 2 Raczej niezadowolony

1 Bardzo niezadowolony

15. W ciągu ostatnich 4 tygodni, jak ocenia Pan swoją pewność, że mógłby Pan mieć i utrzymać wzwód prącia?

5 Bardzo wysoko

4 Wysoko

3 Umiarkowanie

2 Nisko

1 Bardzo nisko

Pytania dotyczące poszczególnych obszarów # suma całkowita

Osiąganie erekcji 1, 2, 3, 4, 5, 15 _____

Osiąganie orgazmu 9, 10 _____

Pożądanie seksualne 11, 12 _____

Satysfakcja ze stosunku seksualnego 6, 7, 8 _____

Ogólna satysfakcja 13, 14 _____

Interpretacja kliniczna

I. Interpretacja całkowitej liczby punktów w obszarze osiągnięcia erekcji:

0-6 zaburzenia ciężkie

7-12 zaburzenia umiarkowane

13-18 zaburzenia niewielkie do umiarkowanych

19-24 zaburzenia umiarkowane

25-30 brak zaburzeń (prawidłowa funkcja erekcyjna)

II. Interpretacja całkowitej liczby punktów w obszarze osiągnięcia orgazmu:

0-2 zaburzenia ciężkie

3-4 zaburzenia umiarkowane

5-6 zaburzenia niewielkie do umiarkowanych

7-8 zaburzenia umiarkowane

9-10 brak zaburzeń

III. Interpretacja całkowitej liczby punktów w obszarze pożądania seksualnego:

0-2 zaburzenia ciężkie

3-4 zaburzenia umiarkowane

5-6 zaburzenia niewielkie do umiarkowanych

7-8 zaburzenia niewielkie

9-10 brak zaburzeń

IV. Interpretacja całkowitej liczby punktów w obszarze satysfakcji ze stosunku seksualnego:

0-3 zaburzenia ciężkie

4-6 zaburzenia umiarkowane

7-9 zaburzenia niewielkie do umiarkowanych

10-12 zaburzenia niewielkie

13-15 brak zaburzeń

V. Interpretacja całkowitej liczby punktów w obszarze ogólnej satysfakcji:

0-2 zaburzenia ciężkie

3-4 zaburzenia umiarkowane

5-6 zaburzenia niewielkie do umiarkowanych

7-8 zaburzenia niewielkie

9-10 brak zaburzeń